

癌症預防及普查專家工作小組針對大腸癌、子宮頸癌及乳癌預防及篩查的建議 (2022 年版)

		年齡																					
		12	25	26	27	28	29	30	44	45	46	47	48	49	50	64	65	66	67	68	69	70	75+
男性及女性	大腸癌	<p style="text-align: center;">50-75 歲</p> <p>(a) 每一至兩年接受一次大便隱血測試；或 (b) 每五年接受一次乙狀結腸鏡檢查；或 (c) 每十年接受一次大腸鏡檢查</p> <p>有較高風險的人士：</p> <ul style="list-style-type: none"> 帶有「連氏綜合症」基因突變的人士，從 25 歲起，每一至兩年接受一次大腸鏡檢查 帶有「家族性大腸腺瘻肉病」基因突變的人士，從 12 歲起，每兩年接受一次乙狀結腸鏡檢查 有一位直系親屬於 60 歲或以前確診大腸癌或有兩位或以上的直系親屬患有大腸癌（不論確診歲數），但沒有遺傳性的腸病的人士： <ul style="list-style-type: none"> (a) 從 40 歲起或按患上大腸癌最年輕親屬的確診年齡計算早十年起（但不早於 12 歲），每五年接受一次大腸鏡檢查；或 (b) 了解大便隱血測試與大腸鏡檢查相關的利弊後，可考慮每一或兩年進行大便隱血測試 																					
	子宮頸癌 (曾有性經驗的婦女)	<p style="text-align: center;">25-29 歲</p> <p>若連續兩年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每三年接受一次篩查</p> <p style="text-align: center;">30-64 歲</p> <p>(a) 若連續兩年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每三年接受一次篩查；或 (b) 每五年接受一次 HPV 檢測；或 (c) 每五年接受一次 HPV 檢測與子宮頸細胞檢驗的合併檢測</p> <p style="text-align: center;">65 歲或以上</p> <p>(a) 如在過去 10 年的常規篩查均得出正常結果，可停止接受篩查 (b) 如從未接受過子宮頸篩查，應該接受篩查</p> <p>有較高風險的婦女：</p> <ul style="list-style-type: none"> 21 至 24 歲而曾有性經驗的婦女，如有感染 / 持續感染 HPV 或患子宮頸癌的風險因素，應按照醫生的評估和建議接受篩查 其他較高風險的婦女須由醫生評估，並可能須接受較頻密的篩查 																					
女性	乳癌	<p style="text-align: center;">44-69 歲</p> <p>如有某些組合的個人化乳癌風險因素*，建議採用網上乳癌風險評估工具 (www.cancer.gov.hk/bctool) 評估罹患乳癌的風險。建議被評定乳癌風險增加的婦女考慮每兩年接受一次乳房 X 光造影篩查</p> <p>時刻關注乳房健康 (即熟悉自己乳房平常的外表和觸感)</p> <p>* 包括有直系親屬曾患乳癌、曾診斷患有良性乳腺疾病、從未生育或第一次生產年齡晚、初經年齡早、體重指數偏高和缺乏體能活動</p> <p>風險屬中等的婦女：每兩年接受一次乳房 X 光造影篩查 高風險婦女：應徵詢醫生意見，及每年接受一次乳房 X 光造影篩查</p> <p>高風險婦女：從 35 歲開始，或按曾患乳癌的最年輕親屬確診時年齡計算早十年開始篩查，但不早於 30 歲</p>																					

圖例：針對有較高風險人士的建議

重要注意事項：接受癌症篩查前應與你的醫療服務提供者討論相關的好處和風險。

有關篩查建議的詳情，請瀏覽 <https://www.chp.gov.hk/tc/static/100854.html>。